


Workflow - Polytrauma - Unfallort

© 12/2008 K.-G. Kanz, B.A. Leidel, U. Kreimeier, W. Mutschler



ABCDE-Prioritäten entsprechend ATLS® (Advanced Trauma Life Support):

- | | |
|---|---|
| <p>A = Airway, C-Spine Control: Tubusfehlalage?</p> <p>B = Breathing, Ventilation:</p> <p>C = Circulation, Hemorrhage Control:</p> <p>D = Disability, Disorientation, Neurologic Status:</p> <p>E = Environment, Exposure:</p> | <p>Atemwegsverlegung? Intubationshindernis?
 Sicherung der Atemwege unter Immobilisation der HWS</p> <p>Spannungspneumothorax? Massiver Hämatothorax? Instabiler Thorax?
 Dekompression der Pleura, Beatmung, Sauerstoffgabe</p> <p>Perikardtamponade? Massive Blutung? Hypovolämie?
 Dekompression des Perikard, Blutungskontrolle, Infusionstherapie</p> <p>Intracraniale Blutung? Hirnödeme?
 Kopfhochlagerung, Sauerstoffgabe, Normotonie (mittlerer arterieller Druck > 90 mmHg)</p> <p>Hypothermie? Weitere Verletzungen?
 Schutz gegen Wärmeverlust, ggf. Erwärmung, Freimachen des Oberkörpers</p> |
|---|---|

Die vollständige Entkleidung des Patienten sollte erst im Schockraum erfolgen, insbesondere Motorradkleidung mit schienenden Protektoren ist zu belassen!